

住家護理人員: COVID-19 篩選流程圖

從這裡開始

在工作人員為他人提供居家護理之前，他們應該首先問自己：

1. 我是否發燒（高於100.0度）或出現新的呼吸道症狀，例如咳嗽，呼吸急促或喉嚨痛？
2. 在過去的14天內，我是否曾去過受COVID-19影響的地區（美國以外）？（查看集控中心的網站，以了解除美國外，受影響的國家名單）
3. 在過去的14天內，我是否密切接觸過（在6英尺或6英尺以內的距離接觸超過15分鐘）被**確診**為COVID-19的患者？
4. 我是否被診斷出患有COVID-19或被醫療保健提供者告知您可能或確實患有COVID-19？

是

如果員工對於以上任一問題的答案為是的話：

員工不應去上班。指導員工通知他們的直接上級領導，傳染病團隊和醫療保健服務提供方，以獲得進一步的指導。

↓ 否

如果員工對於以上所有問題的答案都為否的話，員工或機構工作人員在上門服務前，應致電詢問客戶或代理人，他們或與他們同住的人員當中，是否有人出現以下情況：

1. 是否發燒（高於100.0度）或出現新的呼吸道症狀，例如咳嗽，呼吸急促或喉嚨痛？
2. 在過去的14天內，是否曾去過受COVID-19影響的地區（美國以外）？（查看集控中心的網站，以了解除美國外，受影響的國家名單）
3. 在過去的14天內，是否密切接觸過（在6英尺或6英尺以內的距離接觸超過15分鐘）被**確診**為COVID-19的患者？
4. 是否被診斷出患有COVID-19或被醫療保健提供者告知您可能或確實患有COVID-19？

是

如果客戶對於以上任一問題的答案為是的話，客戶應當致電他們的醫療保健服務提供方，並遵循上述提供方的指導。如果客戶需要您幫忙打電話的話，員工應提供相應的幫助。

然後

↓ 否

如果客戶對於以上所有問題的答案都為否的話

員工應該繼續為客戶提供居家護理，並採取以下防護措施：

- ） 用溫水和肥皂洗手至少20秒，或使用酒精洗手液
- ） 當你咳嗽或打噴嚏的時候，使用至今或手肘內側遮住嘴巴
- ） 將與客戶的身體接觸限制在護理工作所需的範圍內
- ） 在可能的情況下，與客戶和客戶家中其他人保持社交距離

即便你是住家護理人員，也有要每天進行自我篩查和客戶篩查。

如果客戶僅對問題1的回答為是的話

員工應繼續為客戶提供服務，並遵循預防措施，且使用個人防護設備(PPE)，包括：

- ） 讓客戶佩戴口罩；
 - ） 當觸摸客戶的時候，戴手套；
 - ） 限制身體接觸；以及
 - ） 根據該指南，保持自身和客戶的個人衛生
- ） 在可能的情況下，與客戶和客戶家中其他人保持社交距離

如果客戶對於問題1和2；或問題1和3；或問題4的回答為是的話：

機構臨床專員應通知他們的直接上級領導。領導會諮詢傳染病控制/ COVID-19工作組。

員工應繼續為客戶提供服務，並遵循預防措施，且使用個人防護設備(PPE)：

- ） 讓客戶佩戴口罩；
- ） 員工應遵循以下規定：
 - 佩戴國家職業安全與衛生研究院批准的N95或更高等級的呼吸防護口罩
 - 如果有被噴濺的風險，請佩戴眼部防護
 - 戴手套
 - 限制身體接觸；以及
 - 根據該指南，保持自身和客戶的個人衛生
 - 在可能的情況下，與客戶和客戶家中其他人保持社交距離